

Synvisc-One^{MC} - Fiche technique

- Synvisc-One (un viscosupplément) est une injection intra-articulaire simple, utilisée pour soulager la douleur et l'inconfort associés à l'arthrose du genou pendant une période allant jusqu'à six mois¹.
- Synvisc-One n'est pas un médicament, il n'est donc pas associé aux problèmes digestifs et cardiovasculaires que l'on attribue à certains médicaments à prendre par la bouche.
- Les traitements de viscosuppléance servent à rétablir l'équilibre physiologique et rhéologique des tissus articulaires arthritiques.
- Synvisc-One est un traitement de haut poids moléculaire composé d'hylanes (dérivés de l'hyaluronane) et similaire au liquide jeune et sain que l'on retrouve dans les articulations des personnes jeunes, de 18 à 27 ans¹.
- L'arthrose est la forme la plus courante d'arthrite et elle affecte environ un Canadien sur 10². Jusqu'à l'âge de 55 ans, l'arthrose s'observe dans des proportions à peu près semblables chez les hommes et chez les femmes. Après cet âge, les femmes y sont plus sujettes³.
- Les symptômes vont de très bénins à très graves et peuvent nuire aux activités de la vie courante. Les preuves cliniques donnent à penser que plus un patient consulte tôt pour recevoir un traitement de viscosuppléance, meilleurs seront les résultats⁴.
- Synvisc-One s'ajoute à la gamme croissante des produits Synvisc®, qui comprend déjà une formule de trois injections de 2mL, indiquée pour l'arthrose du genou, et une formule d'une injection de 2 mL, indiquée pour l'arthrose de la hanche, de l'épaule et de la cheville.
- Synvisc (en trois injections de 2mL) a été utilisé pour traiter plus de cinq millions de genoux dans le monde en une dizaine d'années d'expérience clinique⁵.
- Synvisc-One est administré par injection intra-articulaire, à raison de 6 mL, directement dans l'articulation du genou.
- Une étude multicentrique, à double insu, randomisée, avec témoins sous placebo a démontré l'efficacité et l'innocuité de Synvisc-One. L'étude a fait état d'un soulagement de la douleur pouvant persister jusqu'à six mois avec Synvisc-One et le traitement a été bien toléré lors de son administration initiale et des traitements répétés⁶.

1. Dépliant de conditionnement de Synvisc-One 2009; Genzyme Canada Inc.
2. Vancouver Coastal Health. http://www.vch.ca/oasis/oa_about.htm
3. Santé Canada. Les aînés et le vieillissement. *Votre santé et vous* 2008;1.
4. Lussier A et coll. Hylan in Clinical Practice. *J Clin Rheumatol* 1996; 23:9.
5. Données internes. Genzyme Corporation.
6. Chevalier X et coll. *Ann Rheum Dis* 2007; 66 (Suppl. II): 494.